

TG/SETARIA(proj.7)
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 2012-08-22

## UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

Ginebra

## **PROYECTO**

### **DANA**

Código UPOV: SETAR\_ITA

Setaria italica (L.) Beauv.

#### **DIRECTRICES**

## PARA LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN

### DE LA DISTINCIÓN, LA HOMOGENEIDAD Y LA ESTABILIDAD

preparadas por un experto de China

para su examen por el

Comité de Redacción Ampliado en su reunión que se celebrará en Ginebra los días 9 y 10 de enero de 2013

#### Nombres alternativos:

Nombre botánico	Inglés	Francés	Alemán	Español
Setaria italica L., Setaria italica (L.) Beauv.	Foxtail Millet, Italian Millet, Hungary Millet	Millet d'Italie, Millet des oiseaux, Setaire d'Italie	Italienhirse, Kolbenhirse	Dana, Mijo de cola de zorro, Moha de Hungría

La finalidad de estas directrices ("directrices de examen") es elaborar los principios que figuran en la Introducción General (documento TG/1/3) y sus documentos TGP conexos, con objeto de que sirvan de orientación práctica y detallada para el examen armonizado de la distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE) y en particular, para identificar los caracteres apropiados para el examen DHE y producir descripciones armonizadas de variedades.

### **DOCUMENTOS CONEXOS**

Estas directrices de examen deberán leerse en conjunción con la Introducción General y sus documentos TGP conexos.

\_

Estos nombres eran correctos en el momento de la adopción de estas directrices de examen pero podrían ser objeto de revisión o actualización. [Se aconseja a los lectores consultar el Código UPOV en el sitio Web de la UPOV (www.upov.int), donde encontrarán la información más reciente.]

## TG/SETARIA(proj.7) Dana, 2012-08-22

- 2 -

	INDICE	<u>Página</u>
1.	OBJETO DE ESTAS DIRECTRICES DE EXAMEN	3
2.	2. MATERIAL NECESARIO	
3.	3. MÉTODO DE EXAMEN	3
	3.1 NÚMERO DE CICLOS DE CULTIVO	
4.	4. EVALUACIÓN DE LA DISTINCIÓN, LA HOMOGENEIDAD Y LA ESTABILID	)AD
	4.1 DISTINCIÓN	5
5.	5. MODO DE AGRUPAR LAS VARIEDADES Y ORGANIZACIÓN DE LOS ENS	SAYOS EN CULTIVO5
6.	6. INTRODUCCIÓN A LA TABLA DE CARACTERES	6
	6.1 CATEGORÍAS DE CARACTERES	
7.	7. TABLE OF CHARACTERISTICS/TABLEAU DES CARACTÈRES/MERKMAL CARACTERES	
8.	8. EXPLICACIONES DE LA TABLA DE CARACTERES	13
	<ul> <li>8.1 EXPLICACIONES RELATIVAS A VARIOS CARACTERES</li></ul>	13
9.	9. BIBLIOGRAFÍA	20
10	10. CUESTIONARIO TÉCNICO	21

- 3 -

#### 1. Objeto de estas directrices de examen

Las presentes directrices de examen se aplican a todas las variedades de Setaria italica (L.) Beauv.

## 2. <u>Material necesario</u>

- 2.1 Las autoridades competentes deciden cuándo, dónde y en qué cantidad y calidad se deberá entregar el material vegetal necesario para la ejecución del examen de la variedad. Los solicitantes que presenten material procedente de un país distinto de aquel en el que se efectuará el examen, deberán asegurarse de que se han cumplido todas las formalidades aduaneras y fitosanitarias.
- 2.2 El material se entregará en forma de semillas.
- 2.3 La cantidad mínima de material vegetal que ha de entregar el solicitante deberá ser de:

100 g.

La semilla deberá satisfacer, por lo menos, los requisitos mínimos de germinación, pureza analítica y de la especie, sanidad y contenido de humedad que especifiquen las autoridades competentes. Cuando la semilla deba almacenarse, la capacidad de germinación deberá ser lo más elevada posible y deberá ser especificada por el solicitante.

- 2.4 El material vegetal proporcionado deberá presentar una apariencia saludable y no carecer de vigor ni estar afectado por enfermedades o plagas importantes.
- 2.5 El material vegetal deberá estar exento de todo tratamiento que afecte la expresión de los caracteres de la variedad, salvo autorización en contrario o solicitud expresa de las autoridades competentes. Si ha sido tratado, se deberá indicar en detalle el tratamiento aplicado.

#### 3. Método de examen

#### 3.1 Número de ciclos de cultivo

La duración mínima de los ensayos deberá ser normalmente de dos ciclos de cultivo independientes."

## 3.2 Lugar de ejecución de los ensayos

Normalmente los ensayos deberán efectuarse en un sólo lugar. En el documento TGP/9 "Examen de la distinción" se ofrece orientación respecto a los ensayos realizados en más de un lugar.

- 3.3 Condiciones para efectuar el examen
- 3.3.1 Se deberán efectuar los ensayos en condiciones que aseguren un desarrollo satisfactorio para la expresión de los caracteres pertinentes de la variedad y para la ejecución del examen.
- 3.3.2 El estado óptimo de desarrollo para evaluar cada carácter se indica mediante un número en la segunda columna de la tabla de caracteres. Los estados de desarrollo indicados por cada número se describen en el Capítulo 8.3.
- 3.4 Diseño de los ensayos
- 3.4.1 Cada ensayo deberá tener por finalidad la obtención de al menos 1.000 plantas, que se dividirán en al menos dos repeticiones.
- 3.4.2 Los ensayos deberán concebirse de tal manera que se permita la extracción de plantas o partes de plantas para efectuar medidas y conteos, sin perjudicar las observaciones ulteriores que deberán efectuarse hasta el final del ciclo de cultivo.

#### 3.5 Ensayos adicionales

Se podrán efectuar ensayos adicionales para estudiar caracteres pertinentes.

## 4. Evaluación de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad

#### 4.1 Distinción

## 4.1.1 Recomendaciones generales

Es de particular importancia para los usuarios de estas directrices de examen consultar la Introducción General antes de tomar decisiones relativas a la distinción. Sin embargo, a continuación se citan una serie de aspectos que han de tenerse en cuenta en las directrices de examen.

#### 4.1.2 Diferencias consistentes

Las diferencias observadas entre variedades pueden ser tan evidentes que no sea necesario más de un ciclo de cultivo. Asimismo, en algunas circunstancias, la influencia del medio ambiente no reviste la importancia suficiente como para requerir más de un único ciclo de cultivo con el fin de garantizar que las diferencias observadas entre variedades son suficientemente consistentes. Una manera de garantizar que una diferencia en un carácter, observada en un ensayo en cultivo, sea lo suficientemente consistente es examinar el carácter en al menos dos ciclos de cultivo independientes

#### 4.1.3 Diferencias claras

Determinar si una diferencia entre dos variedades es clara depende de muchos factores y, para ello se tendría que considerar, en particular, el tipo de expresión del carácter que se esté examinando, es decir, si éste se expresa de manera cualitativa, cuantitativa o pseudocualitativa. Por consiguiente, es importante que los usuarios de estas directrices de examen estén familiarizados con las recomendaciones contenidas en la Introducción General antes de tomar decisiones relativas a la distinción.

## 4.1.4 Número de plantas/ partes de plantas que se ha de examinar

Salvo indicación en contrario, a los efectos de la distinción, todas las observaciones de plantas individuales deberán efectuarse en 20 plantas o partes de cada una de las 20 plantas, y cualquier otra observación se efectuará en todas las plantas del ensayo, sin tener en cuenta las plantas fuera de tipo.

### 4.1.5 Método de observación

El método recomendado para observar los caracteres a los fines del examen de la distinción se indica en la segunda columna de la tabla de caracteres mediante la siguiente clave (véase el documento TGP/9 "Examen de la distinción", sección 4 "Observación de los caracteres"):

MG: medición única de un grupo de varias plantas o partes de plantas

MS: medición de varias plantas o partes de plantas individuales

VG: evaluación visual mediante una única observación de un grupo de varias plantas o partes de plantas

VS: evaluación visual mediante la observación de varias plantas o partes de plantas individuales

Tipo de observación visual (V) o medición (M)

La observación "visual" (V) es una observación basada en la opinión del experto. A los fines del presente documento, por observación "visual" se entienden las observaciones sensoriales de los expertos y, por lo tanto, también incluye el olfato, el gusto y el tacto. La observación visual comprende además las observaciones en las que el experto utiliza referencias (por ejemplo, diagramas, variedades ejemplo, comparación por pares) o gráficos no lineales (por ejemplo, cartas de colores). La medición (M) es una observación objetiva que se realiza frente a una escala lineal calibrada, por ejemplo, utilizando una regla, una báscula, un colorímetro, fechas, recuentos, etc.

Tipo de registro(s): un grupo de plantas (G) o plantas individuales (S)

A los fines de la distinción, las observaciones pueden registrarse mediante una observación global de un grupo de plantas o partes de plantas (G) o mediante observaciones de varias plantas o partes de plantas individuales (S). En la mayoría de los casos, la observación del tipo "G" proporciona un único registro por variedad y no es posible ni necesario aplicar métodos estadísticos en un análisis planta por planta para la evaluación de la distinción."

Para los casos en que en la tabla de caracteres se indica más de un método de observación de los caracteres (p. ej. VG/MG), en la Sección 4.2 del documento TGP/9 se ofrece orientación sobre la elección de un método apropiado.

## 4.2 Homogeneidad

- 4.2.1 Es particularmente importante que los usuarios de estas directrices de examen consulten la Introducción General antes de tomar decisiones relativas a la homogeneidad. Sin embargo, a continuación se citan una serie de aspectos que han de tenerse en cuenta en las directrices de examen.
- 4.2.2 Para la evaluación de la homogeneidad, deberá aplicarse una población estándar del 1% y una probabilidad de aceptación del 95%, como mínimo. En el caso de un tamaño de muestra de 1000 plantas, se permitirán 15 plantas fuera de tipo.

#### 4.3 Estabilidad

- 4.3.1 En la práctica no es frecuente que se conduzcan exámenes de la estabilidad que brinden resultados tan fiables como los obtenidos en el examen de la distinción y la homogeneidad. No obstante, la experiencia ha demostrado que en muchos tipos de variedades, cuando una variedad haya demostrado ser homogénea, también podrá considerarse estable.
- 4.3.2 Cuando corresponda, o en caso de duda, la estabilidad podrá evaluarse adicionalmente, examinando un nuevo lote de semillas, para asegurarse de que presenta los mismos caracteres que el material suministrado inicialmente.
- 5. <u>Modo de agrupar las variedades y organización de los ensayos en cultivo</u>
- 5.1 Los caracteres de agrupamiento contribuyen a seleccionar las variedades notoriamente conocidas que se han de cultivar en el ensayo con las variedades candidatas y a la manera en que estas variedades se dividen en grupos para facilitar la evaluación de la distinción.
- 5.2 Los caracteres de agrupamiento son aquellos en los que los niveles de expresión documentados, aun cuando hayan sido registrados en distintos lugares, pueden utilizarse, individualmente o en combinación con otros caracteres similares: a) para seleccionar las variedades notoriamente conocidas que puedan ser excluidas del ensayo en cultivo utilizado para el examen de la distinción; y b) para organizar el ensayo en cultivo de manera tal que variedades similares queden agrupadas conjuntamente.
- 5.3 Se ha acordado la utilidad de los siguientes caracteres de agrupamiento:
  - a) Planta: pigmentación antociánica de la vaina de la hoja basal (carácter 2)
  - b) Época de espigado (carácter 6)
  - c) Tallo: longitud (carácter 15)
  - d) Grano: color (carácter 27)
  - e) Endospermo: tipo (carácter 29)
- 5.4 En la Introducción General y en el documento TGP/9 Examen de la distinción se dan orientaciones sobre el uso de los caracteres de agrupamiento en el proceso de "examen de la distinción".

### 6. <u>Introducción a la tabla de caracteres</u>

#### 6.1 Categorías de caracteres

#### 6.1.1 Caracteres estándar de las directrices de examen

Los caracteres estándar de las directrices de examen son aquellos que han sido aprobados por la UPOV para el examen DHE y de los cuales los Miembros de la Unión pueden elegir los que convengan para determinadas circunstancias.

#### 6.1.2 Caracteres con asterisco

Los caracteres con asterisco (señalados con \*) son los caracteres incluidos en las directrices de examen que son importantes para la armonización internacional de las descripciones de variedades y que deberán utilizarse siempre en el examen DHE e incluirse en la descripción de la variedad por todos los Miembros de la Unión, excepto cuando el nivel de expresión de un carácter precedente o las condiciones medioambientales de la región lo imposibiliten.

#### 6.2 Niveles de expresión y notas correspondientes

- 6.2.1 Se atribuyen a cada carácter niveles de expresión con el fin de definir el carácter y armonizar las descripciones. A cada nivel de expresión corresponde una nota numérica para facilitar el registro de los datos y la elaboración y el intercambio de la descripción.
- 6.2.2 En el caso de los caracteres cualitativos y pseudocualitativos (véase el Capítulo 6.3), todos los niveles pertinentes de expresión se presentan en el carácter. Sin embargo, en el caso de caracteres cuantitativos con cinco o más niveles puede utilizarse una escala abreviada para reducir al mínimo el tamaño de la tabla de caracteres. Por ejemplo, respecto de un carácter cuantitativo de nueve niveles de expresión, la presentación de los niveles de expresión en las directrices de examen puede abreviarse como sigue:

Nivel	Nota
pequeño	3
mediano	5
grande	7

Ahora bien, cabe observar que los nueve niveles de expresión siguientes existen para describir las variedades y deberán utilizarse según proceda:

Nivel	Nota
muy pequeño	1
muy pequeño a pequeño	2
pequeño	3
pequeño a mediano	4
mediano	5
mediano a grande	6
grande	7
grande a muy grande	8
muy grande	9

6.2.3 Explicaciones más exhaustivas relativas a la presentación de los niveles de expresión y de las notas figuran en el documento TGP/7 "Elaboración de las directrices de examen".

### 6.3 Tipos de expresión

En la Introducción General figura una explicación de los tipos de expresión de los caracteres (cualitativo, cuantitativo y pseudocualitativo).

## 6.4 Variedades ejemplo

En caso necesario, se proporcionan variedades ejemplo con el fin de aclarar los niveles de expresión de un carácter

6.5 Leyenda

(\*) Carácter con asterisco – véase el Capítulo 6.1.2

QL Carácter cualitativo – véase el Capítulo 6.3 QN Carácter cuantitativo – véase el Capítulo 6.3 PQ Carácter pseudocualitativo – véase el Capítulo 6.3

MG, MS, VG, VS – véase el Capítulo 4.1.5

- (a) Véanse las explicaciones de la tabla de caracteres en el Capítulo 8.1
- (+) Véanse las explicaciones de la tabla de caracteres en el Capítulo 8.2
- 11-92 Véanse las explicaciones de la tabla de caracteres en el Capítulo 8.3.

# TG/SETARIA(proj.7) Foxtail Millet/Millet d'Italie/Kolbenhirse/Dana, 2012-08-22 - 8 -

## 7. <u>Table of Characteristics/Tableau des caractères/Merkmalstabelle/Tabla de caracteres</u>

		English	français	deutsch	español	Example Varieties/ Exemples/ Beispielssorten/ Variedades ejemplo	Note/ Nota
1.	VG 11	First leaf: shape of tip	Première feuille : forme du sommet	Erstes Blatt: Form der Spitze	Primera hoja: forma del ápice		
PQ		pointed	pointue	spitz	puntiaguda	Lianggu	1
		pointed to rounded	pointue à arrondie	spitz bis abgerundet	puntiaguda a redondeada	Ribenchixu	2
		rounded	arrondie	abgerundet	redondeada	Yugu 8	3
2. (*) (+)	VG 15	Plant: anthocyanin coloration of basal leaf sheath	Plante : pigmentation anthocyanique de la gaine de la feuille basale	Pflanze: Anthocyanfärbung der basalen Blattscheide	Planta: pigmentación antociánica de la vaina de la hoja basal		
QN		absent or weak	absente ou faible	fehlend oder gering	ausente o débil	Jingumi	1
		medium	moyenne	mittel	media	Ribenchixu	2
		strong	forte	stark	fuerte	Lianggu	3
3.	VG 35	Plant: intensity of green color of foliage	Plante : intensité de la couleur verte du feuillage	Pflanze: Intensität der Grünfärbung des Laubes	Planta: intensidad del color verde del follaje		
QN		light	claire	hell	claro	Jinmiaogu	1
		medium	moyenne	mittel	medio	Yugu 1	3
		dark	foncée	dunkel	oscuro	Jingumi	5
4.	VG 35	Plant: growth habit	Plante : port	Pflanze: Wuchsform	Planta: porte		
QN		erect	dressée	aufgerichtet	erecto	Yugu 1	1
		semi-erect	demi-dressée	halbaufrecht	semierecto	Hongruangu	2
		spreading	étalée	breitwüchsig	extendido	Yin 120	3
5. (+)	VG 35	Plant: anthocyanin coloration of leaf pedestal	Plante : pigmentation anthocyanique du piédestal de la feuille	Anthocyanfärbung des	Planta: pigmentación antociánica de la base de la hoja		
QN		absent or weak	absente ou faible	fehlend oder gering	ausente o débil	Jinmiaogu	1
		medium	moyenne	mittel	media	Lianggu	2
		strong	forte	stark	fuerte	Hongmiaoqing	3
6. (*) (+)	MG	Time of heading	Époque d'épiaison	Zeitpunkt des Rispenschiebens	Época de espigado		
(*)	MG	Time of heading very early	Époque d'épiaison très précoce		Época de espigado muy temprana	Loulixiu	1
(*) (+)	MG	-		Rispenschiebens		Loulixiu Lianggu	1 3
(*) (+)	MG	very early	très précoce	Rispenschiebens sehr früh	muy temprana		
(*) (+)	MG	very early	très précoce précoce	Rispenschiebens sehr früh früh	muy temprana temprana	Lianggu	3

# TG/SETARIA(proj.7) Foxtail Millet/Millet d'Italie/Kolbenhirse/Dana, 2012-08-22 - 9 -

		English	français	deutsch	español	Example Varieties/ Exemples/ Beispielssorten/ Variedades ejemplo	Note/ Nota
7.	VG 45	Stem: anthocyanin coloration of brace roots	Tige : pigmentation anthocyanique des racines	Stengel: Anthocyanfärbung der Stelzwurzeln	Tallo: pigmentacion antociánica de las raíces de anclaje		
QL		absent	absente	fehlend	ausente	Yugu 8	1
		present	présente	vorhanden	presente	Ribenchixu	9
8. (*) (+)	VG 47	Leaf: attitude of blade	Feuille : port du limbe	Blatt: Haltung der Blattspreite	Hoja: porte del limbo		
QN		erect	dressé	aufgerichtet	erecto	Anai 3	1
		semi erect	demi-dressé	halbaufrecht	semierecto	Lianggu	2
		horizontal	horizontal	waagerecht	horizontal	Ribenchixu	3
		drooping	retombant	überhängend	colgante	Jinmiaogu	4
9. (*) (+)	VG 65	Panicle: length of bristles	Panicule : longueur des épines	Rispe: Länge der Borsten	Panícula: longitud de las aristas		
QN		short	courte	kurz	corta	Yugu 8	1
		medium	moyenne	mittel	media	Lianggu	3
		long	longue	lang	larga	Ribenchixu	5
10.	VG 65	Panicle: anthocyanin coloration of bristles		Rispe: Anthocyanfärbung der Borsten	Panícula: pigmentación antociánica de las aristas		
QL		absent	absente	fehlend	ausente	Yugu 8	1
		present	présente	vorhanden	presente	Baishagu	9
11. (*) (+)	VG 65	Anther: color	Anthère : couleur	Anthere: Farbe	Antera: color		
PQ		white	blanche	weiß	blanco	Yugu 8	1
		orange	orange	orange	naranja	Hongmiaoqing	2
		brown	brune	braun	marrón	Yegu 5	3
12.	MS/ MG 71	Flag leaf: length of blade	Dernière feuille : longueur du limbe	Fahnenblatt: Länge der Blattspreite	Última hoja: longitud del limbo		
QN		short	courte	kurz	corto	Loulixiu	3
		medium	moyenne	mittel	medio	Lianggu	5
		long	longue	lang	largo	Yegu 5	7
13. (+)	MS/ MG 71	Flag leaf: width of blade	Dernière feuille : largeur du limbe	Fahnenblatt: Breite der Blattspreite	Última hoja: anchura del limbo		
QN		very narrow	très étroite	sehr schmal	muy estrecho	Loulixiu	1
		medium	moyenne	mittel	medio	Hongshilixiang	3
		very broad	très large	sehr breit	muy ancho	Anai 4	5

# TG/SETARIA(proj.7) Foxtail Millet/Millet d'Italie/Kolbenhirse/Dana, 2012-08-22 - 10 -

		English	français	deutsch	español	Example Varieties/ Exemples/ Beispielssorten/	Note/ Nota
						Variedades ejemplo	Nota
14.	VG 71	Flag leaf: anthocyanin coloration of blade	Dernière feuille : pigmentation anthocyanique du limbe	Fahnenblatt: Anthocyanfärbung der Blattspreite	Última hoja: pigmentación antociánica del limbo		
QN		weak	faible	gering	débil	Jinmiaogu	1
		medium	moyenne	mittel	media	Lianggu	3
		strong	forte	stark	fuerte	Bianganhuang	5
15. (*) (+)	MS/ MG 71	Stem: length	Tige : longueur	Halm: Länge	Tallo: longitud		
QN		very short	très courte	sehr kurz	muy corto	Loulixiu	1
		short	courte	kurz	corto	Zhangai 10	3
		medium	moyenne	mittel	medio	Kenya	5
		long	longue	lang	largo	Lianggu	7
		very long	très longue	sehr lang	muy largo	Yintianhan	9
16.	MG	Stem: diameter	Tige : diamètre	Halm: Durchmesser	Tallo: diámetro		
(+)	71						
QN		small	petit	klein	pequeño	Loulixiu	1
		medium	moyen	mittel	medio	Lianggu	3
		large	grand	groß	grande	Yintianhan	5
17.	VG 81	Glume: anthocyanin coloration	Glume : pigmentation anthocyanique	Hüllspelze: Anthocyanfärbung	Gluma: pigmentación antociánica		
QL		absent	absente	fehlend	ausente	Yanandali	1
		present	présente	vorhanden	presente	Yugu 8	9
18.		Plant: number of elongated internodes	Plante : nombre	Pflanze: Anzahl gestreckter Internodien	Planta: número de		
(+)	0.02	olongalou illomouo	allongés	good containment of the	ominomados anargados		
QN		few	petit	gering	bajo	Hongshilixiang	3
		medium	moyen	mittel	mediano	Yegu 5	5
		many	élevé	groß	alto	W 77	7
19. (*) (+)	_	Panicle: attitude in relation to stem	Panicule : port par rapport à la tige	Rispe: Haltung im Vergleich zum Halm	Panícula: porte en relación con el tallo		
QN	(a)	erect	dressée	aufgerichtet	erecto	Anai 3	1
		semi erect	demi-dressée	halbaufrecht	semierecto	Yugu 8	2
		horizontal	horizontale	waagerecht	horizontal	Lianggu	3
		drooping	retombante	überhängend	colgante	Ribenchixu	4

# TG/SETARIA(proj.7) Foxtail Millet/Millet d'Italie/Kolbenhirse/Dana, 2012-08-22 - 11 -

		English	français	deutsch	español	Example Varieties/ Exemples/ Beispielssorten/ Variedades ejemplo	Note/ Nota
20. (*) (+)	MS/ MG 91-92	peduncle	Plante : longueur du pédoncule	Pflanze: Länge des Rispenstiels	Planta: longitud del pedúnculo		
QN	(a)	short	courte	kurz	corto	Ai 88	3
		medium	moyenne	mittel	medio	Anai 17	5
		long	longue	lang	largo	Anai 3	7
21. (*) (+)	VG 91-92	Panicle: shape	Panicule : forme	Rispe: Form	Panícula: forma		
PQ	(a)	conical	conique	konisch	cónica	Hongfengu	1
		spindle	fusiforme	spindelförmig	fusiforme	Kenya	2
		cylindrical	cylindrique	zylindrisch	cilíndrica	Ai 88	3
		club	en massue	klump	claviforme	Taohuami	4
		duck mouth	bec de canard	Entenschnabel	en forma de boca de pato	W 59	5
		cat foot	patte de chat	Katzenpfote	en forma de pie de gato	Maotigu	6
		branched	ramifiée	verzweigt	ramificada	Foshougu	7
22. (*)	MS/ MG 92	Panicle: length	Panicule : longueur	Rispe: Länge	Panícula: longitud		
QN	(a)	short	courte	kurz	corta	Loulixiu	3
		medium	moyenne	mittel	media	Hongshilixiang	5
		long	longue	lang	larga	Yintianhan	7
23. (*) (+)	MG 92	Excluding varieties with panicle shape: branched: Panicle: density	À l'exclusion des variétés avec forme en panicule : ramifiée : Panicule : densité	Ohne Sorten mit Form der Rispe: verzweigt: Rispe: Dichte	Excluidas las variedades con forma de panícula: ramificada: Panícula: densidad		
QN	(a)	lax	lâche	locker	laxa	Jinmiaogu	1
		medium	moyenne	mittel	media	Lianggu	3
		dense	dense	dicht	densa	Yugu 8	5
24. (+)	MS/ MG 92	Panicle: number of grains on primary branch	Panicule : nombre de grains sur la ramification principale	Rispe: Anzahl Köner am Primärast	Panícula: número de granos en la rama primaria		
QN	(a)	few	faible	gering	bajo	Ribenchixu	3
		medium	moyen	mittel	medio	Lianggu	5
		many	élevé	groß	alto	W 77	7
	MG	1000 grain weight	Poids de 1 000 grains	Tausendkorngewicht	Peso de 1.000 granos		
25. (*)	92		•				
	92	low	petit	gering	pequeño	W 67	3
(*)	92	low medium		gering mittel	pequeño medio	W 67 Hongmiaoqing	3 5

# TG/SETARIA(proj.7) Foxtail Millet/Millet d'Italie/Kolbenhirse/Dana, 2012-08-22 - 12 -

		English	français	deutsch	español	Example Varieties/ Exemples/ Beispielssorten/ Variedades ejemplo	Note/ Nota
26. (*) (+)	VG 92	Grain: shape	Grain : forme	Korn: Form	Grano: forma		
PQ		narrow ovate	ovale étroit	schmal eiförmig	oval estrecho		1
		medium ovate	ovale moyen	mittel eiförmig	oval medio		2
		circular	circulaire	kreisförmig	circular		3
27. (*)	VG 92	Grain: color	Grain : couleur	Korn: Farbe	Grano: color		
PQ		whitish	blanchâtre	weißlich	blanquecino	Anai 3	1
		grey	gris	grau	gris	Kenya	2
		yellow	jaune	gelb	amarillo	Jinmiaogu, Ribenchixu	3
		brown	brune	braun	marrón	Yugu 8	4
		red	rouge	rot	rojo	Hongmiaoqing	5
		black	noire	schwarz	negro	Heiniangu	6
28. (*)	VG 92	Dehusked grain: color (not polished)	Grain décortiqué : couleur (sans polissage)	Entspelztes Korn: Farbe (nicht poliert)	Grano descascarado: color (sin pulir)		
PQ		whitish	blanchâtre	weißlich	blanquecino	Taohuami	1
		grey	gris	grau	gris	Hongmiaoqing	2
		yellow	jaune	gelb	amarillo	Lianggu, Yugu 8	3
29. (*) (+)	VG 92	Endosperm: type	Endosperme : type	Endosperm: Typ	Endospermo: tipo		
QL		waxy	cireux	wachsig	ceroso		1
		non-waxy	non cireux	nicht-wachsig	no ceroso		2

## 8. <u>Explicaciones de la tabla de caracteres</u>

## 8.1 Explicaciones relativas a varios caracteres

Los caracteres que contengan la siguiente clave en la segunda columna de la tabla de caracteres deberán examinarse como se indica a continuación:

(a) Las observaciones se efectuarán en la panícula del tallo principal-

## 8.2 Explicaciones relativas a caracteres individuales


## Ad. 1: Primera hoja: forma del ápice




## Ad. 2: Planta: pigmentación antociánica de la vaina de la hoja basal



Ad. 4: Planta: porte



Ad. 5: Planta: pigmentación antociánica de la base de la hoja




Ad. 6: Época de espigado

La época de espigado es la época en que el 50% de las plantas han alcanzado la estadio 45.


## Ad. 8: Hoja: porte del limbo

Las observaciones deberán efectuarse en el tercio medio de las hojas del tallo.



## Ad. 9: Panícula: longitud de las aristas

Las aristas tienen su origen en las espiguillas estériles.



## Ad. 11: Antera: color

Las observaciones deberán efectuarse temprano en la mañana antes de la separación de las anteras.

## Ad. 13: Última hoja: anchura del limbo

Las observaciones deberán efectuarse en la parte más ancha del limbo.


Ad. 15: Tallo: longitud

Ad. 18: Planta: número de entrenudos alargados

Ad. 20: Planta: longitud del pedúnculo

Ad. 22: Panícula: longitud


El número de entrenudos alargados se determinará contando los entrenudos alargados, excluido el pedúnculo.




## Ad. 16: Tallo: diámetro

Deberá observarse entre el tercer y el cuarto nudo a partir de la base.

Ad. 19: Panícula: porte en relación con el tallo



Ad. 21: Panícula: forma



Ad. 23: Excluidas las variedades con forma de panícula: ramificada: panícula: densidad

La densidad de la panícula es el número de raquis por centímetro en el tercio medio de la panícula.

## Ad. 24: Panícula: número de granos en la rama primaria

El número de granos se deberá contar en una rama primaria tomada a partir del tercio medio de la panícula del tallo principal.

Ad. 26: Grano: forma



Ad. 29: Endospermo: tipo

El carácter se observa por reacción a una solución de yoduro de potasio al 3% y yodo al 1%: el tipo de endospermo ceroso se tiñe de púrpura rojizo; el tipo no ceroso se tiñe de púrpura azulado.

## 8.3 Código decimal de estadios de desarrollo de los cereales (Dana)

Código de dos cifras	Descripción general	
1	2	
Germinación	1	
00	Semilla seca	
01	Comienzo de la imbibición	
02		
03	Imbibición completa	
04		
05	La radícula emerge de la cariópside	
06		
07	Aparición del coleóptilo	
08		
09	Aparición de la hoja en el ápice del coleóptilo	
Desarrollo de plántul	las	
10	Aparición de la primera hoja a través del coleóptilo	
11	Primera hoja desplegada	
12	2 hojas desplegadas	
13	3 hojas desplegadas	
14	4 hojas desplegadas	
15	5 hojas desplegadas	
16	6 hojas desplegadas	
17	7 hojas desplegadas	
18	8 hojas desplegadas	
19	9 o más hojas desplegadas	
Macollaje	1	
20	Únicamente el brote principal	
21	Brote principal y 1 hijuelo	
22	Brote principal y 2 hijuelos	
23	Brote principal y 3 hijuelos	
24	Brote principal y 4 hijuelos	
25	Brote principal y 5 hijuelos	
26	Brote principal y 6 hijuelos	
27	Brote principal y 7 hijuelos	
28	Brote principal y 8 hijuelos	
29	Brote principal y 9 hijuelos	
Elongación del tallo		•
30	Erección del pseudotallo	
31	Primer nudo detectable	
32	Segundo nudo detectable	
33	Tercero nudo detectable	
34	Cuarto nudo detectable	
35	Quinto nudo detectable	
_	1	I

Código de dos cifras	Descripción general			
36	Sexto nudo detectable			
37	Séptimo nudo detectable			
38	Octavo nudo detectable			
39	Lígula de la última hoja apenas visible			
Hinchamiento y apa	arición de la inflorescencia			
40				
41	Vaina hinchada			
43	10% de la inflorescencia visible			
45	50% de la inflorescencia visible			
47	Inflorescencia completamente visible			
49				
Antesis				
60	Comienzo de la antesis			
65	Mitad de la antesis			
69	Antesis completa			
Estado lechoso				
70				
71	Estado acuoso de la maduración de la cariópside			
73	Comienzo del estado lechoso			
75	Estado semilechoso			
77	Fin del estado lechoso			
Estado pastoso				
80				
81	Comienzo del estado pastoso			
85	Pastoso blando			
89	Pastoso duro			
Maduración				
90				
91	La cariópside está dura (resulta difícil cortarla con la uña)			
92	La cariópside está dura (ya no se puede hacer una marca con la uña)			
93	La cariópside se separa durante el día			
94	Exceso de madurez, la paja está muerta y se desprende			
95	Semillas en estado de latencia			
96	Semillas viables con 50% de germinación			
97	Fin del estado de la latencia en las semillas			

## 9. <u>Bibliografía</u>

Institute of Plant Germplasm, CAAS, 1985: Catergery of Chinese Land Races of Foxtail Millet. Agriculture Press. Beijing, CN.

Ping Lu, 2006: Descriptors and Data standard for foxtail millet (*Setaria italica* (L.) Beauv.). China Agriculture Press. Beijing, CN.

Xianmin Diao, Wei Li, Zhihai Zhao, Wenying Zhang, Hui Zhi, Yongfang Wang, Runqi Wang, Peng Wang, 2005: Guidelines for the Conduct of Test for Distinctness, Uniformity and Stability of Foxtail Millet (*Setaria italica* Beauv.). Chinese standard, in Chinese.

Yinmei Li et al., 1997: Breeding of Foxtail Millet. Agriculture Press. Beijing, CN.

Zadoks, J.C., Chang, T.T., Konzak, C.F., 1974: A decimal code for the growth stages of cereals. Weed Research 14: pp. 415-421.

## 10. <u>Cuestionario Técnico</u>

CUES	STIONARIO TÉCNICO		Página {x} de {y}	Número de referencia:
				Fecha de la solicitud: (no debe ser rellenado por el solicitante)
	rellénese		CUESTIONARIO TÉCNICO o con la solicitud de derech	
1.	Objeto del Cuestionario Técnico			
	1.1 Nombre botánico	Set	aria italica (L.) Beauv.	
	1.2 Nombre común	Dar	na	
2.	Solicitante			
	Nombre			
	Dirección			
	Número de teléfono			
	Número de fax			
	Dirección de correo-e			
	Obtentor (si no es el solicitante)			1
	L			
3.	Denominación propuesta y refere	ncia	del obtentor	
	Denominación propuesta (si procede)			
	Referencia del obtentor			

CUESTIONARIO TÉCNICO	Página {x} de {y}	Número de referencia:

<sup>#</sup> 4.	Info	rmación so	obre el método de obtención y la reproducción de la variedad								
	4.1	Método de obtención									
		Varieda	Variedad resultante de:								
		4.1.1	Cruzamiento								
			a) cruzamiento controlado     (sírvase mencionar las variedades parentales)	[ ]							
			ental femenina x ( Inea parental masculina	)							
			b) cruzamiento parcialmente desconocido (sírvase mencionar la variedad o variedades parentales con	[ ] ocidas)							
			ental femenina x (ental femenina	)							
			c) cruzamiento desconocido	[ ]							
		4.1.2	Mutación (sírvase mencionar la variedad parental)	[]							
		4.1.3	Descubrimiento y desarrollo (sírvase mencionar dónde y cuándo ha sido descubierta y cómo variedad)	[ ] ha sido desarrollada la							
		4.1.4	Otro (sírvase dar detalles)	[ ]							
	4.2	Método	o de reproducción de la variedad								
	_		Tipo de material a) línea línea masculina fértil línea masculina estéril b) híbrido c) otro (sírvase especificar)								
			le las variedades híbridas, el método de producción se presenta lo detalles de todas las líneas parentales necesarias para reproducir e								

<sup>&</sup>lt;sup>#</sup> Las autoridades podrán disponer que parte de esta información se suministre en una sección confidencial del Cuestionario Técnico

CUESTIONARIO TÉCNICO Página {x} de {y} Número de referencia:

5. Caracteres de la variedad que se deben indicar (el número entre paréntesis indica el carácter correspondiente en las directrices de examen; especifíquese la nota apropiada).

	Caracteres	Ejemplos	Nota
5.1 (2)	Planta: pigmentación antociánica de la vaina de la hoja basal		
	ausente o débil	Jingumi	1[]
	media	Ribenchixu	2[]
	fuerte	Lianggu	3[]
5.2 (6)	Época de espigado		
	muy temprana	Loulixiu	1[]
	muy temprana a temprana		2[]
	temprana	Lianggu	3[]
	temprana a media		4[]
	media	Jinmiaogu	5[]
	media a tardía		6[]
	tardía	Ribenchixu	7[]
	tardía a muy tardía		8[]
	muy tardía	W56	9[]
5.3 (15)	Tallo: longitud		
	muy corto	Loulixiu	1[]
	muy corto a corto		2[]
	corto	Zhangai 10	3[]
	corto a medio		4[]
	medio	Kenya	5[]
	medio a largo		6[]
	largo	Lianggu	7[]
	largo a muy largo		8[]
	muy largo	Yintianhan	9[]

CUESTIONARIO TÉCNICO Página {x} de {y} Número de referencia:

	Caracteres	Ejemplos	Nota
5.4 (27)	Grano: color		
	blanquecino	Anai 3	1[]
	gris	Kenya	2[]
	amarillo	Jinmiaogu, Ribenchixu	3[]
	marrón	Yugu 8	4[]
	rojo	Hongmiaoqing	5[]
	negro	Heiniangu	6[]
5.5 (29)	Endospermo: tipo		
	ceroso		1[]
	no ceroso		2[]

TG/SETARIA(proj.7) Dana, 2012-08-22 - 25 -

CUESTIONARIO TÉCNICO	Página {x} d	e {y} Número de re	Número de referencia:			
6. Variedades similares y diferencias con respecto a esas variedades  Sírvase utilizar la tabla y el recuadro de comentarios siguientes para suministrar información acerca de la diferencia entre su variedad candidata y la variedad o variedades que, a su leal saber y entender, es o son más similares. Esta información puede ser útil para que las autoridades encargadas del examen realicen el examen de la distinción.						
Denominación de la variedad o variedades similares a su variedad candidata difiere de las variedades similares		Describa la expresión de le caracteres de las variedad similares				
Ejemplo Ho	oja: porte del limbo	erecto	semierecto			
Comentarios:						

CUESTIONARIO TÉCNICO		Página {x} de {y}		{y}	Número de referencia:					
<sup>#</sup> 7.	Información complementaria que pueda facilitar el examen de la variedad									
7.1		demás de la información suministrada en los Capítulos 5 y 6, ¿existen caracteres adicionales que puedan contribuir a distinguir la variedad?								
	Sí	[]	I	No	[	]				
	(En ca	so afirmat	ivo, sírvase especifica	ar)						
7.2	¿Existen condiciones especiales de cultivo de la variedad o de realización del examen?									
	Sí	[]	1	No	[	]				
	(En caso afirmativo, sírvase especificar)									
7.3	Otra ir	ra información								
8.	Autorización para la diseminación									
	a) ¿Se exige una autorización previa para poder diseminar la variedad en virtud de la legislación relativa a la protección del medio ambiente y la salud humana y animal?									
		Sí	[]		No		[ ]			
	b)	¿Se ha o	btenido dicha autoriza	ación	?					
		Sí	[]		No		[ ]			
	Si la segunda respuesta es afirmativa, sírvase presentar una copia de la autorización.									

<sup>&</sup>lt;sup>#</sup> Las autoridades podrán disponer que parte de esta información se suministre en una sección confidencial del Cuestionario Técnico

TG/SETARIA(proj.7) Dana, 2012-08-22 - 27 -

CUESTIONARIO TÉCNICO				Página {x} de {y}	eferencia:					
9.	Información sobre el material vegetal que deberá ser examinado o presentado para ser examinado.									
efectos	9.1 La expresión de un carácter o de varios caracteres de una variedad puede verse afectada por factores tales como las plagas y enfermedades, los tratamientos químicos (por ejemplo, retardadores del crecimiento, pesticidas), efectos del cultivo de tejidos, distintos portainjertos y patrones tomados en distintos estados de desarrollo de un árbol, etcétera.									
9.2 El material vegetal deberá estar exento de todo tratamiento que afecte la expresión de los caracteres de la variedad, salvo autorización en contra o solicitud expresa de las autoridades competentes. Si el material vegetal ha sido tratado, se deberá indicar en detalle el tratamiento aplicado. Por consiguiente, sírvase indicar a continuación si, a su leal saber y entender, el material vegetal que será examinado ha estado expuesto a:										
	a)	Microorganismo	os (por ejemplo	, virus, bacterias, fitoplasm	a)	Sí[]	No [ ]			
	b)	Tratamiento quí retardadores de		-		Sí[]	No [ ]			
	c)	Cultivo de tejido	)			Sí[]	No [ ]			
	d)	Otros factores				Sí[]	No [ ]			
	Si ha contestado afirmativamente a alguna de las preguntas sírvase suministrar detalles.									
10. Por la presente declaro que, a mi leal saber y entender, la información proporcionada en este formulario es correcta:										
N	ombre (	del solicitante								
Firma					Fecha					

[Fin del documento]